



CADUBAL

COMPANHIA DE ADUBOS, SA.

Ficha normalizada de produto – COURAZE

| Agroquímicos | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------|
| Produto | COURAZE | |
| Família | Inseticida | |
| APV | 3733 | CHEMINOVA |
| Classificação Toxicológica | Perigoso para o ambiente. | |

| Composição Química | | |
|--------------------|--------------|--------------------------|
| Substancia Ativa | Concentração | Formulação |
| imidaclopride | 200 gr/l | SL – Solução concentrada |

| Apresentação | 50 ml | 1 L | 5 L |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Caixa | 24 unidades | 12 unidades | 4 unidades |
| Palete | 120 Caixas | - | - |

| Recomendação de utilização |
|--|
| O Couraze é um inseticida sistémico á base de imidaclopride, que atua por contacto e ingestão. |

| Culturas | Pragas | Dose | Intervalo de Segurança | Época de Tratamento |
|--------------|------------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| Batateira | Escaravelho | 75 ml/hl | 21 dias | Início do ataque |
| Pimenteiro | Afídeos, Mosca branca | 50 ml/hl | 3 dias | Início do ataque |
| Tomateiro | Afídeos, Mosca branca | 50 ml/hl | 3 dias | Início do ataque |
| Meloeiro | Afídeos | 50 ml/hl | 3 dias | Início do ataque |
| Pessegueiro | Afídeo verde e outros | 50 ml/hl | 14 dias | Início do ataque |
| Cerejeira | Afídeos | 50 ml/hl | 21 dias | Início do ataque |
| Macieira | Mineiras, Afídeos verde e cinzento | 50 ml/hl | 14 dias | Início do ataque |
| Pereira | Afídeos | 50 ml/hl | 14 dias | Início do ataque |
| Citrios – a) | Mosca branca | 75 ml/hl | 14 dias | b) |
| Citrios – a) | Mineiras das folhas dos rebentos | 50 ml/hl | 14 dias | c) |
| Videira | Cicadela ou cigarrinha verde | 35 ml/hl | 14 dias | d) |
| Tabaco | Afídeos | 50 ml/hl | 14 dias | Início do ataque |

a) Não aplicar em Limoeiro.

Página 1/2



CADUBAL

COMPANHIA DE ADUBOS, SA.

- b) 75 ml/hl ou 50 ml/hl de Couraze + 1L/hl de Óleo de Verão. Primeira aplicação no início do ataque após a eclosão dos ovos, repetir 21 dias depois em caso de necessidade.
- c) Juntar 0,5L/hl de Óleo de Verão. Primeira aplicação no início do ataque, repetir em caso de necessidade 14 a 21 dias depois, de forma a proteger os novos rebentos.
- d) Aplicar em vinhas atacadas, após a floração, quando houver 100 larvas em cada 100 folhas observadas. A partir de Julho realizar os tratamentos se houver 50 larvas por cada 100 folhas observadas.

Observações

As boas práticas agrícolas recomendam:

Não aplicar o **COURAZE** durante a floração das culturas, porque o produto é prejudicial para as abelhas o que pode afetar a polonização.

No caso dos Citrinos, quando se mistura Óleo, deve-se regar o pomar antes das aplicações e não aplicar desde a floração até os frutos terem o tamanho de uma noz.

Não aplicar mais produto do que a dose necessária.

Entregar as embalagens vazias, num ponto de recolha autorizado.

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado durante a aplicação do **COURAZE**.

A leitura deste documento, não dispensa a leitura atenta do rótulo.

Marca registada **CHEMINOVA, Dinamarca.**

Importado e comercializado em Portugal, por: **Cadubal – Companhia de Adubos, SA.**

Página 2/2

Cadubal – Companhia de Adubos, S.A.

Telefone: 258350300 Fax: 258351737 Email: geralcadubal@cadubal.com

Site: www.cadubal.com Capital Social 1.190.000 €